

Συμπυκνωμένο πολυβιταμινούχο σκεύασμα σε υγρή μορφή για πτηνά, χοίρους και μηρυκαστικά

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΛΙΤΡΟ

Βιταμίνη Α	4 230 000	IU	Βιταμίνη Β ₆	1 200	mg
Βιταμίνη D ₃	1 000 000	IU	Βιταμίνη Β ₁₂	12 000	mcg
Βιταμίνη Ε	5 000	mg	Νικοτιναμίδιο	12 000	mg
Βιταμίνη Κ ₃	800	mg	Παντοθενικό ασβέστιο	3 000	mg
Βιταμίνη Β ₁	1 200	mg	Βιταμίνη C	5 000	mg
Βιταμίνη Β ₂	2 500	mg			

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το ACTIVIT είναι μια διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή που βοηθάει σε περιπτώσεις διατροφικών ανισορροπιών και υποστηρίζει την προετοιμασία του οίστρου και της αναπαραγωγής.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προστατεύει από ανεπάρκεια βιταμινών
- Σταθεροποιεί τις αποδόσεις των παραγωγικών ζώων σε υψηλό επίπεδο
- Χορηγείται σε περιπτώσεις που τα ζώα έχουν ανάγκη από την προσθήκη στο πόσιμο νερό ισόρροπου πολυβιταμινούχου σκευάσματος όπως π.χ.:
 - ✓ σε περιόδους καταπόνησης (stress) ή εκδήλωσης νοσημάτων
 - ✓ μετά από εμβολιασμό ή θεραπεία
 - ✓ κατά την διάρκεια αλλαγών των συνθηκών διατροφής και σταβλισμού
- Προασπίζει την ακεραιότητα του επιθηλίου του πεπτικού, του αναπνευστικού και του αναπαραγωγικού συστήματος
- Βοηθάει στην ρύθμιση του μεταβολισμού του ασβεστίου και του φωσφόρου
- Ενισχύει τον μεταβολισμό των υδατανθράκων
- Προάγει την κυτταρική αναπνοή

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Πτηνά: 1,1 – 2 λίτρα Activit υγρό ανά 1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Αίγες γαλακτοπαραγωγής: 600 ml/1000 λίτρα πόσιμου νερού. **Χοίροι αναπαραγωγής:** 300 ml/ζώο/ημέρα

Πρόβατα γαλακτοπαραγωγής: 1,2 λίτρα/1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Απογαλακτισμένα βοοειδή, πρόβατα και αίγες: 425 ml/1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 451 ml/1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Μοσχίδες: 844 ml/1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Αγελάδες σε θηλασμό και ξηρά περίοδο: 435 ml/1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Νεαρά βοοειδή, ταυρίδια: 457 ml/1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Συνήθης διάρκεια εφαρμογής: 2 έως 15 ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δοσολογία ανά είδος ζώου, ανά διατροφικό σκοπό και την διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος διαβάστε την ετικέτα.

Πριν από τη χρήση ή πριν από την επιμήκυνση της περιόδου χρήσης, πρέπει να λαμβάνονται συμβουλές από ειδικό στην διατροφή ή κτηνίατρο. Ανακινείστε καλά πριν την χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία του 1 ή 5 λίτρων.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Προστατέψτε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον αέρα. Κλείστε την συσκευασία μετά την χρήση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

24 μήνες μετά την ημερομηνία παρασκευής, στον αρχικό περιέκτη χωρίς να ανοιχτεί.



**ANIMAL
HEALTH
PRODUCTS**

Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr - web: www.ahprod.gr



ZI de Très le Bois - CS 60362
22603 LOUDEAC CEDEX

N° d'agrément distributeur :
a FR 22 136 044
vital-concept.com



5 207291 035406 >

Είδος ζώου:
Ζώα αναπαραγωγής

ACTIVIT

Διαιτητική Συμπληρωματική Ζωοτροφή

Υποστήριξη της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής
Υποστήριξη των διατροφικών ανισορροπιών στην διατροφική
μετάβαση

Πρώτες ύλες: 13.11.1 Προπυλενογλυκόλη, 13.5.5 Σορβιτόλη

Πρόσθετες ύλες ανά λίτρο:

3a - βιταμίνες z
3a672b Βιταμίνη A: 4 230 000 UI
3a671 Βιταμίνη D3: 1 000 000 UI
3a315 Νικοτινιμίδιο: 12 000 mg
3a700 Βιταμίνη E: 5 000 mg
3a300 Βιταμίνη C: 5 000 mg
3a842 D-πανθενόλη: 3 000 mg
3a826 Βιταμίνη B2: 2 500 mg
3a820 Βιταμίνη B1: 1 200 mg
3a831 Βιταμίνη B6: 1 200 mg
3a710 Βιταμίνη K3: 800 mg
3a835 Βιταμίνη B12: 12 mg

Αναλυτικά συστατικά:

Υγρασία: 89,395%
Ολικές Αζωτούχες Ουσίες: 0,134%
Ολικές Ινώδεις Ουσίες: <0,001%
Ολικές Λιπαρές Ουσίες: <0,003%
Ολική Τέφρα: 0,072%
Λυσίνη: <0,001%
Μεθειονίνη: <0,001%
Νάτριο: 0,025%

δηγίες χρήσης:

Ανακινείστε πριν τη χρήση. Να χρησιμοποιείται απευθείας στο σπέρμα ή αραιωμένο σε νερό.
Η δόση θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση, σύμφωνα με την
παρακάτω μέγιστη δόσολογία ανά είδος ζώου.

Συστάσεις:

Το προϊόν πρέπει να παραμένει αποθηκευμένο στην
αρχική συσκευασία, ερμητικά κλειστό, προστατευμένο
από το φως και μεταξύ 5 και 25 °C. Πριν από τη χρήση
συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ειδικού στην διατροφή ή
κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της περιόδου
χρήσης.

Συσκευασία: 1 ΛΙΤΡΟ

Ημερομηνία Παραγωγής:

01/2023

Ημερομηνία Λήξης:

01/2025

Αριθμός Παρτίδας:

2300901

Agreement:

aFR 22-171-015



ZI de Très le Bois - CS 60362
22603 LOUDEAC CEDEX

N° d'agrément distributeur :
a FR 22 136 044
vital-concept.com



5 207291 035406 >

Είδος ζώου:
Ζώα αναπαραγωγής

ACTIVIT

Διαιτητική Συμπληρωματική Ζωοτροφή

Διατροφικές ανεπάρκειες	Υποστήριξη της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής	Υποστήριξη των διατροφικών ανισορροπιών στην αναπαραγωγή
Διάρκεια χρήσης	Συνιστάται ανάλογα με το είδος ζώου (βλέπε παρακάτω)	2 έως 15 ημέρες
Αρχικές γαλακτοπαραγωγές	457 mL σε 1000 L νερό 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβίβαση της επόμενης κύησης	457 mL σε 1000 L νερό
Αρχικές σε θηλασμό και (ή) περίοδο	495 mL σε 1000 L νερό 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβίβαση της επόμενης κύησης	495 mL σε 1000 L νερό
Μοσχίλες	844 mL σε 1000 L νερό 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβίβαση της επόμενης κύησης	844 mL σε 1000 L νερό
Νερά βοσκή, ταυρίδα	457 mL σε 1000 L νερό Φυλικά: από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβίβαση της επόμενης κύησης Αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας	457 mL σε 1000 L νερό
Αλογαλακτομένο βοσκό, πρόβατα και αιγες	425 mL σε 1000 L νερό Φυλικά: από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβίβαση της επόμενης κύησης Αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας	425 mL σε 1000 L νερό
Αίγιες γαλακτοπαραγωγές	600 mL σε 1000 L νερό από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβίβαση της επόμενης κύησης	600 mL σε 1000 L νερό
Πρόβατα γαλακτοπαραγωγές	12 L σε 1000 L νερό από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβίβαση της επόμενης κύησης	12 L σε 1000 L νερό
κόριο αναπαραγωγής	300 mL σε 1000 L νερό Προσφύονται: 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά τον τοκετό και 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά το θνήσκειο. Αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας	300 mL σε 1000 L νερό
κοτόπουλα	Λιγότερο από 14 ημέρες: 2 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας. Πάνω από 14 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.	Λιγότερο από 14 ημέρες: 2 L σε 1000 L νερό Πάνω από 14 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό
Οπτικές θήκες	1 L σε 1000 L νερό Λιγότερο από 28 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.	1 L σε 1000 L νερό
Γαλακτοίκες	Λιγότερο από 28 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.	Λιγότερο από 28 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό
Φογκώδεις	Λιγότερο από 14 ημέρες: 1,6 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας. Πάνω από 14 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.	Λιγότερο από 14 ημέρες: 1,6 L σε 1000 L νερό Πάνω από 14 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό