

Διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή με βιταμίνες και απαραίτητα αμινοξέα σε υγρή μορφή

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΛΙΤΡΟ

Πρόσθετες ύλες / Λίτρο:

Αμινοξέα:

Γλυκίνη	5 000 mg
Νικοτινιμίδιο	10 000 mg
L-λυσίνη	20 000 mg
DL-Μεθειονίνη	10 000 mg
L-θρεονίνη	10 000 mg
L-τρυπτοφάνη	2 000 mg

Βιταμίνες:

Βιοτίνη	15 mg
Βιταμίνη Α	4 230 000 Ι.Υ.
Βιταμίνη D ₃	1 000 000 Ι.Υ.
Βιταμίνη Ε	5 000 mg
Βιταμίνη Β ₁	1 250 mg
Βιταμίνη Β ₂	2 000 mg
Βιταμίνη Β ₆	1 500 mg
Βιταμίνη Β ₁₂	5 000 mcg

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το ACTIV AMINOVIT είναι διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή που βοηθάει σε περιπτώσεις διατροφικών ανισορροπιών και υποστηρίζει την προετοιμασία του οίστρου και της αναπαραγωγής.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προστατεύει από ανεπάρκεια βιταμινών και αμινοξέων
- Σταθεροποιεί τις αποδόσεις των παραγωγικών ζώων σε υψηλό επίπεδο
- Χορηγείται σε περιπτώσεις που τα ζώα έχουν ανάγκη από την προσθήκη στο πόσιμο νερό ισόρροπου σκευάσματος βιταμινών και απαραίτητων αμινοξέων όπως π.χ.:
 - ✓ σε περιόδους αύξησης/αποκατάστασης σωματικής διάπλασης
 - ✓ σε περιόδους καταπόνησης (stress) ή εκδήλωσης νοσημάτων
 - ✓ μετά από εμβολιασμό ή θεραπεία
- κατά την διάρκεια αλλαγών των συνθηκών διατροφής και σταβλισμού
- Προασπίζει την ακεραιότητα του επιθηλίου του πεπτικού, του αναπνευστικού και του αναπαραγωγικού συστήματος
- Βοηθάει στην ρύθμιση του μεταβολισμού του ασβεστίου και του φωσφόρου
- Ενισχύει τον μεταβολισμό των υδατανθράκων και της πρωτεϊνών σύνθεσης
- Προάγει την κυτταρική αναπνοή

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Πτηνά: 1,1 - 2 λίτρα ACTIV AMINOVIT ανά 1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Αίγες γαλακτοπαραγωγής και Χοίροι αναπαραγωγής: 6 ml/ζώο/ημέρα.

Πρόβατα γαλακτοπαραγωγής: 12 ml/ζώο/ημέρα. **Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής:** 47 ml/ζώο/ημέρα.

Απογαλακτισμένα βοοειδή, πρόβατα και αίγες: 5,1 ml/ζώο/ημέρα. **Μοσχίδες:** 38 ml/ζώο/ημέρα.

Αγελάδες σε θηλασμό και ξηρά περίοδο: 31 ml/ζώο/ημέρα. **Νεαρά βοοειδή, ταυρίδια:** 14 ml/ζώο/ημέρα.

Συνήθης συνιστώμενη διάρκεια εφαρμογής: 2 έως 15 ημέρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δοσολογία ανά είδος ζώου, ανά διατροφικό σκοπό και την διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος διαβάστε την ετικέτα.

Πριν από τη χρήση ή πριν από την επιμήκυνση της περιόδου χρήσης, πρέπει να λαμβάνονται συμβουλές από ειδικό στην διατροφή ή κτηνίατρο. Ανακινείστε καλά πριν την χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία του 1 ή των 5 λίτρων.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Προστατέψτε το προϊόν από την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και τον αέρα. Κλείστε την συσκευασία μετά την χρήση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

24 μήνες μετά την ημερομηνία παρασκευής, στον αρχικό περιέκτη χωρίς να ανοιχτεί.



**ANIMAL
HEALTH
PRODUCTS**

Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr - web: www.ahprod.gr



ACTIV AMINONIT

Διαιτητική Συμπληρωματική Ζωοτροφή
Υποστήριξη της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής Υποστήριξη των διατροφικών ανισορροπιών στην διατροφική μετάβαση

Πρόσθετες ύλες ανά λίτρο:

3a - βιταμίνες	
3a672b Βιταμίνη A:	4 230 000 UI
3a671 Βιταμίνη D3 :	1 000 000 UI
3a315 Νικοτιναμίδιο :	10 000 mg
3a700 Βιταμίνη E :	5 000 mg
3a826 Βιταμίνη B2:	2 000 mg
3a831 Βιταμίνη B6:	1 500 mg
3a820 Βιταμίνη B1:	1 250 mg
3a880 Βιοτίνη:	15 mg
3a835 Βιταμίνη B12:	5 mg
2b - αρωματικές ουσίες :	
2b17034 Γλυκίνη:	5 000 mg
3c- αμινοξέα :	
3c322 L-λυσίνη μονοϋδροχλωρική	20 000 mg
3c301 DL-μεθειονίνη:	10 000 mg
3c410 L-θρεονίνη:	10 000 mg
3c440 L-τρυπτοφάνη:	2 000 mg

Πρώτες ύλες:

13.11.1 Προπυλενογλυκόλη,
11.4.2 Διπανθρακικό νάτριο,
13.5.5 Σορβιτόλη

Αναλυτικά συστατικά :

Υγρασία :	89,296%
Ολικές Αζωτούχες Ουσίες:	4,320%
Ολικές Ινώδεις Ουσίες:	0,141%
Ολικές Λιπαρές Ουσίες :	0,015%
Ολική Τέφρα:	0,462%
Λυσίνη:	1,913%
Μεθειονίνη:	0,971%
Νάτριο:	0,281%

Οδηγίες χρήσης:

Ανακινείστε πριν τη χρήση. Να χρησιμοποιείται απευθείας στο σιτηρέσιο ή αραιωμένο σε νερό. Η δόση θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση, σύμφωνα με την παρακάτω μέγιστη δοσολογία ανά είδος ζώου.

Συσκευασία : 1 ΛΙΤΡΟ

Ημερομηνία Παραγωγής:

XX/XX/XX

Ημερομηνία Λήξης:

XX/XX/XX

Αριθμός Παρτίδας:

XXXXXX

Agrement :
aFR 22-171-015



ACTIV AMINONIT

Διαιτητική Συμπληρωματική Ζωοτροφή

Διατροφικός σκοπός	Υποστήριξη της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής	Υποστήριξη των διατροφικών ανισορροπιών στην διατροφική μετάβαση
Διάρκεια χρήσης	Διάρκεια ανάλογα με το είδος ζώου (βλ. πίνακα παρακάτω)	2 έως 15 ημέρες
Λιχλάδες γαλακτοπαραγωγής	47 ml, 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επώαση των αυγών	47 ml
Λιχλάδες σε θηλασμό και (ή) παρμόδο	31 ml, 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επώαση των αυγών	31 ml
Μουσίδες	38 ml, 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επώαση των αυγών	38 ml
Παρά βοοειδή, ταυρίδια	14 ml Θηλαστικό: από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επώαση των αυγών Αρσενικό: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής δραστηριότητας	14 ml
Απογαλακτιζόμενα βοοειδή, πρόβατα και αιγες	5,1 ml Θηλαστικό: από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επώαση των αυγών Αρσενικό: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής δραστηριότητας	5,1 ml
Αιγες γαλακτοπαραγωγής	6 ml, από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επώαση των αυγών	6 ml
Πρόβατα γαλακτοπαραγωγής	12 ml, από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επώαση των αυγών	12 ml
Χοίροι αναπαραγωγής	6 ml Χοιρομήτρες: 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά τον ποτό και 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά το ζευγάρωμα Αρσενικό: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής δραστηριότητας	6 ml
Κατσίτσες	Λιχλάδα από 14 ημέρες: 2 L σε 1000 L νερό. Για τα θηλαστικά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής δραστηριότητας. Πάνω από 14 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό. Για τα θηλαστικά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής δραστηριότητας.	Λιχλάδα από 14 ημέρες: 2 L σε 1000 L νερό Πάνω από 14 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό
Ποτεινές όρνιθες	1,1 L σε 1000 L νερό, κατά τη διάρκεια του οίστρου.	1,1 L σε 1000 L νερό
Γαλοπούλες	Λιχλάδα από 28 ημέρες: 1,9 L σε 1000 L νερό. Για τα θηλαστικά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής δραστηριότητας. Πάνω από 28 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό. Για τα θηλαστικά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής δραστηριότητας.	Λιχλάδα από 28 ημέρες: 1,9 L σε 1000 L νερό Πάνω από 28 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό
Φοργολέτσες	Λιχλάδα από 14 ημέρες: 1,6 L σε 1000 L νερό. Για τα θηλαστικά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής δραστηριότητας. Πάνω από 14 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό. Για τα θηλαστικά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής δραστηριότητας.	Λιχλάδα από 14 ημέρες: 1,6 L σε 1000 L νερό Πάνω από 14 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό