

Διαιτητική Συμπληρωματική Ζωοτροφή με Βιταμίνη E, Se και Zn σε υγρή μορφή για την υποστήριξη της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής σε πτηνά, χοίρους και μηρυκαστικά

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΛΙΤΡΟ

Βιταμίνη E:	100 000 mg
Σελήνιο:	200 mg
Ψευδάργυρος (ένυδρο χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύρου-γλυκίνης):	10 000 mg

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Υγρό πρόμιγμα Βιταμίνης E, Σεληνίου και Ψευδαργύρου ως συμπληρωματικά θρεπτικά συστατικά στο σιτηρέσιο, με στόχο την προετοιμασία του οίστρου και της αναπαραγωγής σε πτηνά, χοίρους και μηρυκαστικά.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, που βοηθούν να αντιμετωπιστούν πολλά από τα προβλήματα τα οποία οφείλονται σε διαταραχές στην οξειδοαναγωγική κατάσταση των κυττάρων π.χ.: πνευμονία, φλεγμονές του εντέρου, σηψαιμία, επαναλαμβανόμενη απόφραξη των αεραγωγών, μείωση του φαινομένου «wooden breast» στα κρεοπαραγωγά ορνίθια (42+ ημέρες), νέκρωση κυττάρων του στήθους κρεοπαραγωγών ορνίθων κ.α.
- Βελτιώνει την αναπαραγωγή των ζώων
- Διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα
- Μειώνει το φαινόμενο της καταπόνησης (stress) που προκαλείται σε περιόδους αυξημένης θερμοκρασίας μετά από εμβολιασμό, μετά από φαρμακευτική αγωγή κ.α.
- Έχει αντιτοξικές ιδιότητες
- Προάγει την συντήρηση και την καλύτερη εικόνα του σφαγίου γιατί επιβραδύνει την αλλοίωση του λιπώδη ιστού του σφαγίου
- Μειώνει το φαινόμενο της κινητικής αταξίας
- Μειώνει το φαινόμενο αιμορραγικού συνδρόμου

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

0,25 – 0,5 λίτρα Activ Se/E/Zn υγρό ανά 1000 λίτρα πόσιμου νερού. Διαλύεται αποκλειστικά στο νερό. Ανακινείτε καλά πριν τη χρήση. Οι συνιστώμενες δοσολογίες θα πρέπει να τηρούνται.

Συνιστώμενη διάρκεια εφαρμογής:

- Θηλυκά πτηνά: κατά την αναπαραγωγική περίοδο
- Αρσενικά πτηνά: Κατά την διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας
- Αγελάδες: 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης
- Χοιρομήτρες: 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά τον τοκετό και 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά το ζευγάρισμα.
- Άλλα θηλυκά θηλαστικά από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβεβαίωση της κύησης

Λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης, η συμπληρωματική ζωοτροφή θα πρέπει να χορηγείται έως το 0,25% της ημερήσιας κατανάλωσης

Πριν από τη χρήση ή πριν από την επιμήκυνση της περιόδου χρήσης, πρέπει να λαμβάνονται συμβουλές από ειδικό στη διατροφή ή κτηνίατρο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία του 1 ή 5 λίτρων

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Προστατέψτε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον αέρα. Κλείστε την συσκευασία μετά την χρήση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

24 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία.



ZI de Très le Bois - CS 60362
22603 LOUDEAC CEDEX
N° d'agrément distributeur :
α FR 22 136 044
vital-concept.com



5 207291 035413 >

Είδος ζώου:
Ζώα αναπαραγωγής



Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέφυρου 33, 166 75
Παύδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr
web: www.ahprod.gr

ACTIV Se/E/Zn

Διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή

Διατροφικός στόχος: Υποστήριξη της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής

Σύνθεση: 13.11.1 Προτυλεονογλικόλη, 11.4.1 Χλωριούχο νάτριο

Πρόσθετες ύλες ανά L:

1a - Συντηρητικά
Συντηρητικά ως μείγμα: 0.2%
1c - Γαλακτωματοποιητές
E 484 Κακονελαϊκόδες γλυκερυλο-πολυαιθυλενογλυκολεστέρας: 210 000 mg
3a - Βιταμίνες
3a700 Βιταμίνη E: 100 000 mg
3b - Ιννοσταχία
E 8 Σελήνιο (σεληνιώδες νάτριο): 200 mg
3b607 Ψευδάργυρος από ένυδρο χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύρου-γλυκίνης (στερεό): 10 000 mg

Αναλυτικά συστατικά :

Υγρασία: 54.7%
Ολικές Αζωτούχες Ουσίες: 1.7%
Ολικές Ινώδεις Ουσίες: 0.1%
Ολικές Λιπαρές Ουσίες: 10.7%
Ολική Τέφρα: 1.3%
Λυσίνη: 0.0%
Μεθειονίνη: 0.0%
Νάτριο: 0.06%

Οδηγίες χρήσης

Δοσολογία:

0,25 – 0,5 λίτρα Activ Se/E/Zn υγρό ανά 1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Διαλύεται αποκλειστικά στο νερό. Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Οι συνιστώμενες δοσολογίες θα πρέπει να τηρούνται.

Συνιστώμενη διάρκεια εφαρμογής:

Αγελάδες: 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης.

Χοιρομήτρες: 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά τον τοκετό και 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά το ζευγάρισμα.

Άλλα θηλυκά θηλαστικά: από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης.

Θηλυκά πτηνά: κατά την διάρκεια του οίστρου.

Αρσενικά: κατά την διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.

Πριν από τη χρήση ή πριν από την επιμήκυνση της περιόδου χρήσης, πρέπει να λαμβάνονται συμβουλές από ειδικό στη διατροφή ή κτηνίατρο.

Συστάσεις:

Φυλάσσεται σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον.
Προστατεύστε από το άμεσο ηλιακό φως και τον αέρα.

Διατροφικές συμβουλές:

Η συμπληρωματική ζωοτροφή μπορεί να περιέχει σελήνιο σε συγκέντρωση υψηλότερη από το εκατοναπλάσιο της σχετικής ορισμένης μέγιστης περιεκτικότητας σε πλήρεις ζωοτροφές. Λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης, η συμπληρωματική ζωοτροφή θα πρέπει να χορηγείται έως το 0,25% της ημερήσιας κατανάλωσης. Σε περίπτωση σιωπηλού οίστρου, χαμηλού ποσοστού επιτυχίας σπερματέγχυσης και μειωμένης ζυγικότητας.

Συσκευασία : 1 ΛΙΤΡΟ

Ημερομηνία Παραγωγής:

XX/XXXX

Ημερομηνία Λήξης:

XX/XXXX

Αριθμός Παρτίδας:

XXXXXXXX

Agreement:
α FR 22 171 015