

Συμπυκνωμένο πολυβιταμινούχο σκεύασμα σε υγρή μορφή για πτηνά, χοίρους και μηρυκαστικά

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΛΙΤΡΟ

Βιταμίνη Α	4 230 000	IU	Βιταμίνη Β ₆	1 200	mg
Βιταμίνη D ₃	1 000 000	IU	Βιταμίνη Β ₁₂	12 000	mcg
Βιταμίνη Ε	5 000	mg	Νικοτιναμίδιο	12 000	mg
Βιταμίνη Κ ₃	800	mg	Παντοθενικό ασβέστιο	3 000	mg
Βιταμίνη Β ₁	1 200	mg	Βιταμίνη C	5 000	mg
Βιταμίνη Β ₂	2 500	mg			

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το ACTIVIT είναι μια διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή που βοηθάει σε περιπτώσεις διατροφικών ανισορροπιών και υποστηρίζει την προετοιμασία του οίστρου και της αναπαραγωγής.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προστατεύει από ανεπάρκεια βιταμινών
- Σταθεροποιεί τις αποδόσεις των παραγωγικών ζώων σε υψηλό επίπεδο
- Χορηγείται σε περιπτώσεις που τα ζώα έχουν ανάγκη από την προσθήκη στο πόσιμο νερό ισόρροπου πολυβιταμινούχου σκευάσματος όπως π.χ.:
 - ✓ σε περιόδους καταπόνησης (stress) ή εκδήλωσης νοσημάτων
 - ✓ μετά από εμβολιασμό ή θεραπεία
 - ✓ κατά την διάρκεια αλλαγών των συνθηκών διατροφής και σταβλισμού
- Προασπίζει την ακεραιότητα του επιθηλίου του πεπτικού, του αναπνευστικού και του αναπαραγωγικού συστήματος
- Βοηθάει στην ρύθμιση του μεταβολισμού του ασβεστίου και του φωσφόρου
- Ενισχύει τον μεταβολισμό των υδατανθράκων
- Προάγει την κυτταρική αναπνοή

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Πτηνά: 1,1 – 2 λίτρα Activit υγρό ανά 1000 λίτρα πόσιμο νερού.

Αίγες γαλακτοπαραγωγής: 600 ml/1000 λίτρα πόσιμο νερού.

Χοίροι αναπαραγωγής: 300 ml/1000 λίτρα πόσιμο νερού

Πρόβατα γαλακτοπαραγωγής: 1,2 λίτρα/1000 λίτρα πόσιμο νερού.

Απογαλακτισμένα βοοειδή, πρόβατα και αίγες: 425 ml/1000 λίτρα πόσιμο νερού.

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 451 ml/1000 λίτρα πόσιμο νερού.

Μοσχίδες: 844 ml/1000 λίτρα πόσιμο νερού.

Αγελάδες σε θηλασμό και ξηρά περίοδο: 435 ml/1000 λίτρα πόσιμο νερού.

Νεαρά βοοειδή, ταυρίδια: 457 ml/1000 λίτρα πόσιμο νερού.

Συνήθης διάρκεια εφαρμογής: 2 έως 15 ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δοσολογία ανά είδος ζώου, ανά διατροφικό σκοπό και την διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος διαβάστε την ετικέτα.

Πριν από τη χρήση ή πριν από την επιμήκυνση της περιόδου χρήσης, πρέπει να λαμβάνονται συμβουλές από ειδικό στην διατροφή ή κτηνίατρο. Ανακινείστε καλά πριν την χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία του 1 ή 5 λίτρων.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Προστατέψτε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον αέρα. Κλείστε την συσκευασία μετά την χρήση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

24 μήνες μετά την ημερομηνία παρασκευής, στον αρχικό περιέκτη χωρίς να ανοιχτεί.



Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
 Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
 Τηλέφωνο: 210 96 08 800
 Email: info@ahprod.gr web: www.ahprod.gr
 Αρ. Έγκρισης Υ.Α.Α. & Τ.: αΕΛ020 0041
 Κωδικός Εγγραφής: 22220 020 000237



ZI de Très le Bois - CS 60362
22603 LOUDEAC CEDEX

N° d'agrément distributeur :
a FR 22 136 044
vital-concept.com



5 207291 035406 >

Είδος ζώου:
Ζώα αναπαραγωγής

ACTIVIT

Διαιτητική Συμπληρωματική Ζωοτροφή

Υποστήριξη της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής
Υποστήριξη των διατροφικών ανισορροπιών στην διατροφική
μετάβαση

Πρώτες ύλες: 13.11.1 Προτυλεονογλυκόλη, 13.5.5 Σορβιτόλη

Πρόσθετες ύλες ανά λίτρο:

3a - βιταμίνες Z	4 230 000 UI
3a672b Βιταμίνη A:	1 000 000 UI
3a671 Βιταμίνη D3 :	12 000 mg
3a315 Νικοτινικό οξύ :	5 000 mg
3a700 Βιταμίνη E :	5 000 mg
3a300 Βιταμίνη C :	3 000 mg
3a842 D-πανθενόλη :	2 500 mg
3a826 Βιταμίνη B2:	1 200 mg
3a820 Βιταμίνη B1:	1 200 mg
3a831 Βιταμίνη B6:	800 mg
3a710 Βιταμίνη K3:	12 mg
3a835 Βιταμίνη B12:	

Αναλυτικά συστατικά :

Υγρασία :	89,395%
Ολικές Αζωτούχες Ουσίες:	0,134%
Ολικές Ινώδεις Ουσίες:	<0,001%
Ολικές Λιπαρές Ουσίες :	<0,003%
Ολική Τέφρα:	0,072%
Λυσίνη:	<0,001%
Μεθειονίνη:	<0,001%
Νάτριο:	0,025%

δηγίες χρήσης:

Ανακατεύετε πριν τη χρήση. Να χρησιμοποιείται απευθείας στο σπέρμα ή αραιωμένο σε νερό. Η δόση θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση, σύμφωνα με την παρακάτω μέγιστη δοσολογία ανά είδος ζώου.

Συστάσεις:

Το προϊόν πρέπει να παραμένει αποθηκευμένο στην αρχική συσκευασία, ερμητικά κλειστά, προστατευμένο από το φως και μεταξύ 5 και 25 °C. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ειδικού στην διατροφή ή κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης.

Συσκευασία : 1 ΛΙΤΡΟ

Ημερομηνία Παραγωγής:
01/2023
Ημερομηνία Λήξης:
01/2025
Αριθμός Παρτίδας:
2300901

Agrement :
aFR 22-171-015



ZI de Très le Bois - CS 60362
22603 LOUDEAC CEDEX

N° d'agrément distributeur :
a FR 22 136 044
vital-concept.com



5 207291 035406 >

Είδος ζώου:
Ζώα αναπαραγωγής

ACTIVIT

Διαιτητική Συμπληρωματική Ζωοτροφή

Διατροφικός σκοπός	Προσφορά της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής	Προσφορά των διατροφικών ανισορροπιών στην διατροφική μετάβαση
Διακεταί χυμός	457 ml σε 1000 L νερό	2 έως 15 ημέρες
Αγλύκες γαλακτοπαγωγής	2 εφθήμερες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβίβαση της επόμενης κύησης	451 ml σε 1000 L νερό
Αγλύκες σε θερμοστά και θερμό περίοδο	485 ml σε 1000 L νερό	2 εφθήμερες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβίβαση της επόμενης κύησης
Μισοζίδες	844 ml σε 1000 L νερό	2 εφθήμερες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβίβαση της επόμενης κύησης
Νερά βοσκού, παύρια	457 ml σε 1000 L νερό	Φθινόπωρο: από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβίβαση της επόμενης κύησης Αρσενικό: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής διασπρόσπαστες
Απογαλακτισμένα βοσκού, πρόβατα και αίγες	425 ml σε 1000 L νερό	Φθινόπωρο: από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβίβαση της επόμενης κύησης Αρσενικό: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής διασπρόσπαστες
Αίγες γαλακτοπαγωγής	600 ml σε 1000 L νερό	από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβίβαση της επόμενης κύησης
Πρόβατα γαλακτοπαγωγής	12 L σε 1000 L νερό	από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβίβαση της επόμενης κύησης
Κοίρα αναπαραγωγής	300 ml σε 1000 L νερό	Παραγωγή: 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά το τοκετό και 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά το θύσημα. Αρσενικό: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής διασπρόσπαστες
Κερίσκια	Λιγότερο από 14 ημέρες: 2 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής διασπρόσπαστες	Λιγότερο από 14 ημέρες: 2 L σε 1000 L νερό
Οστικές όφειδες	Πάνω από 14 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής διασπρόσπαστες	Πάνω από 14 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό
Γαλακτοείδες	1 L σε 1000 L νερό, κατά τη διάρκεια του οίστρου.	1 L σε 1000 L νερό
Γαλακτοείδες	Λιγότερο από 28 ημέρες: 1,9 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής διασπρόσπαστες	Λιγότερο από 28 ημέρες: 1,9 L σε 1000 L νερό
Γαλακτοείδες	Πάνω από 28 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής διασπρόσπαστες	Πάνω από 28 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό
Φορμαλίνες	Λιγότερο από 14 ημέρες: 1,6 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής διασπρόσπαστες	Λιγότερο από 14 ημέρες: 1,6 L σε 1000 L νερό
Φορμαλίνες	Πάνω από 14 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής διασπρόσπαστες	Πάνω από 14 ημέρες: 1 L σε 1000 L νερό