



Lerasept® VET 300

Απολυμαντικό με τρία δραστικά συστατικά και MG-ενεργοποιητή

Το Lerasept® VET 300 είναι ένα απολυμαντικό επιφανειών ευρέος φάσματος για τον κτηνιατρικό τομέα, με ισχυρά, επιφανειοδραστικά συστατικά και έντονη διεισδυτική σε βάθος ικανότητα. Χρησιμοποιείται για την τακτική απολύμανση στάβλων ζώων, εγκαταστάσεων στέγασης και εξοπλισμού, καθώς και οχημάτων μεταφοράς. Επίσης, το Lerasept® VET 300 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό και την απολύμανση δαπέδων σε κτηνιατρικές εγκαταστάσεις και κλινικές. Είναι αποτελεσματικό κατά βακτηρίων, ζυμομυκήτων και ιών, συμπεριλαμβανομένου του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ASF) και της Γρίπης των Πτηνών (Avian Influenza virus H5N2).



Συμβατότητα

Το διάλυμα του προϊόντος είναι κατάλληλο για μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες που χρησιμοποιούνται συνήθως στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής.

Χρήση

1. Το Lerasept® VET 300 χρησιμοποιείται στον κτηνιατρικό τομέα για την απολύμανση σκληρών επιφανειών, δαπέδων, τοίχων, κτιριακών εγκαταστάσεων ζώων. Μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό ή αφρισμό. Η εφαρμογή του απολυμαντικού διαλύματος πραγματοποιείται με την βοήθεια κάνης ψεκασμού, συστημάτων ψεκασμού, συμβατικού τύπου συσκευές ψεκασμού ή αφρισμού. Οι επιφάνειες, στις οποίες θα γίνει η εφαρμογή, πρέπει να είναι καλά καθαρισμένες και όσο το δυνατόν πιο στεγνές. Όγκος διαλύματος εφαρμογής 400 ml ανά m2.

2. Το Lerasept® VET 300 χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους (ΤΠ2) για την απολύμανση σκληρών επιφανειών, δαπέδων και τοίχων σε κτηνιατρικές εγκαταστάσεις και κλινικές. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει και με το σφουγγάρισμα.

Το προϊόν έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 1656, 1657, 13624, 13697, 13727, 14349, 14675, 16438 και 17122.

Για επαγγελματίες χρήστες μόνο.

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από την χρήση.

Έγκριση Βιοκτόνου σκευάσματος

Δανία	PR nr. 4397923
Γερμανία	BAuA: N-102199
Γαλλία	N°Inventaire: 67289
Αυστρία	registered
Πολωνία	7981/20
Σερβία	registered
Σλοβακία	bio/3844/D/21/CCHLP
Ελλάδα	Αρ. πρωτ. Ε.Ο.Φ: 26222/01-03-2024/ΑΠ-1671
Μολδαβία	P-0183/2024

Σημαντικά συστατικά

Γλουταραλδεϋδη (110 γρ./κιλό), benzyl(C12-16)-alkyl dimethylammonium chlorid (80 γρ./κιλό), didecyl dimethylammonium chlorid (35 γρ./κιλό), επιφανειοδραστικές ουσίες, σταθεροποιητές.

Κατά τη χρήση των προϊόντων, πρέπει να τηρούνται τα προληπτικά μέτρα που ισχύουν για τον χειρισμό χημικών ουσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και τους κινδύνους, καθώς και για συμβουλές ασφαλείας, ανατρέξτε στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας. Τα διαλύματα εφαρμογής και τα υπολείμματα προϊόντων πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Οι αναφερόμενες οδηγίες αντιστοιχούν στην προηγούμενη εμπειρία μας. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών συνθηκών λειτουργίας, μπορούν να δοθούν μόνο μη δεσμευτικές πληροφορίες και συμβουλές. Συνεπώς, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για αξιώσεις τρίτων. Εξαιρούνται σφάλματα, αλλαγές και τυπογραφικά λάθη. Μη δεσμευτικές πληροφορίες προϊόντος, ημερομηνία έκδοσης 26 Σεπτεμβρίου 2025, δεν υπόκεινται σε συστηματικές αλλαγές.

Κατηγορία

Βιοκτόνο

Τιμή pH

Ελαφρώς όξινο

Δραστικά συστατικά

Γλουταραλδεϋδη

Τεταρτοταγείς Ενώσεις Αμμωνίου (QAV)

Αποτελεσματικότητα

Βακτηριοκτόνο

Ζυμοκτόνο

Ιοκτόνο

Κατάσταση προϊόντος

Υγρό

Συμμορφώνεται

IHO (Γερμανικός Σύνδεσμος Υγιεινής και Προστασίας Επιφανειών)

DVG (Γερμανικός Σύλλογος Κτηνιάτρων)

Πιστοποιημένο

Halal

Εξουσιοδοημένος διανομέας



**ANIMAL
HEALTH
PRODUCTS**

Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
T: 210 9608800 E: info@mediprod.gr
Web: www.ahprod.gr

TÜV
AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 20001260018819

TÜV
AUSTRIA
EN ISO 14001:2015
No.: 20051260018820

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co.KG
Am Stadtholz 37
33609 Bielefeld
www.stockmeier.com

Lerasept® VET 300

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφές
Εμφάνιση	διαυγές υγρό
Τιμή pH	3,0 - 6,0
Πυκνότητα (20°C)	1,010 - 1,060 g/cm ³



Συμπεριφορά υγρών αποβλήτων

Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, δεν γνωρίζουμε τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Πληροφορίες αποθήκευσης

Φυλάσσεται σε σφραγισμένους περιέκτες σε δροσερό και ξηρό μέρος. Προστατεύστε το από την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως, τον παγετό και την θερμότητα. Οποιαδήποτε περίσσεια ποσότητα προϊόντος που αφαιρείται δεν πρέπει ποτέ να επιστρέφεται στον αρχικό περιέκτη.

Πληροφορίες πρώτων βοηθειών

Γενικές συμβουλές: Αφαιρέστε αμέσως τυχόν ρούχα που έχουν λερωθεί με το προϊόν. Συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και μετά από αρκετές ώρες, επομένως απαιτείται ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το ατύχημα. Μετά από εισπνοή: Παρέχετε ανανεωμένο/φρέσκο/καθαρό αέρα και καλέστε γιατρό για λόγους ασφαλείας. Μετά από επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε τις πληγείσες περιοχές με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό. Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με τρεχούμενο νερό, με τα μάτια ανοιχτά, για αρκετά λεπτά. Στην συνέχεια, συμβουλευτείτε γιατρό. Μετά από κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό και εξασφαλίστε φρέσκο/καθαρό αέρα. Καλέστε αμέσως γιατρό. Πληροφορίες για τον γιατρό: Συμπτωματική θεραπεία.

Αποτελεσματικότητα

Παθογόνος μικροοργανισμός	Θερμοκρασία	Χρόνος	Μόλυνση	Εφαρμογή
1. Απολύμανση επιφανειών με ψεκασμό (TP3)				
Βακτήρια, προληπτική απολύμανση σύμφωνα με τα πρότυπα του Γερμανικού Συλλόγου Κτηνιάτρων (DVG)	10°C	120 λεπτά	χαμηλή	1% προϊόντος, δηλαδή (≙), αραιώστε 100 ml απολυμαντικού προϊόντος σε 10 λίτρα νερού, όγκος διαλύματος εφαρμογής 400 ml ανά m ²
ζυμομύκητες	10°C	120 λεπτά	χαμηλή	0,25% προϊόντος, δηλαδή (≙), αραιώστε 25 ml απολυμαντικού προϊόντος σε 10 λίτρα νερού
Ιούς που φέρουν περίβλημα σύμφωνα με τα πρότυπα του Γερμανικού Συλλόγου Κτηνιάτρων (DVG)	10°C	60 λεπτά	χαμηλή	3% προϊόντος, δηλαδή (≙), αραιώστε 300 ml απολυμαντικού προϊόντος σε 10 λίτρα νερού, όγκος διαλύματος εφαρμογής 400 ml ανά m ²
Βόειος εντεροϊός (ECBO)	10°C	30 λεπτά	χαμηλή	1% προϊόντος, δηλαδή (≙), αραιώστε 100 ml απολυμαντικού προϊόντος σε 10 λίτρα νερού
Βόειος εντεροϊός (ECBO)	10°C	120 λεπτά	υψηλή	2% προϊόντος, δηλαδή (≙), αραιώστε 200 ml απολυμαντικού προϊόντος σε 10 λίτρα νερού
Ιός της γρίπης των πτηνών (H5N2)	10°C	30 λεπτά	χαμηλή	0,5% προϊόντος, δηλαδή (≙), αραιώστε 50 ml απολυμαντικού προϊόντος σε 10 λίτρα νερού
Ιός Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων	10°C	30 λεπτά	χαμηλή	0,1% προϊόντος, δηλαδή (≙), αραιώστε 10 ml απολυμαντικού προϊόντος σε 10 λίτρα νερού
2. Απολύμανση επιφανειών με ψεκασμό (TP2)				
Βακτήρια, ζυμομύκητες	20°C	30 λεπτά	υψηλή	0,25% προϊόντος, δηλαδή (≙), αραιώστε 25 ml απολυμαντικού προϊόντος σε 10 λίτρα νερού

Κατά τη χρήση των προϊόντων, πρέπει να τηρούνται τα προληπτικά μέτρα που ισχύουν για τον χειρισμό χημικών ουσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και τους κινδύνους, καθώς και για συμβουλές ασφαλείας, ανατρέξτε στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας. Τα διαλύματα εφαρμογής και τα υπολείμματα προϊόντων πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Οι αναφερόμενες οδηγίες αντιστοιχούν στην προηγούμενη εμπειρία μας. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών συνθηκών λειτουργίας, μπορούν να δοθούν μόνο μη δεσμευτικές πληροφορίες και συμβουλές. Συνεπώς, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για αξιώσεις τρίτων. Εξαιρούνται σφάλματα, αλλαγές και τυπογραφικά λάθη. Μη δεσμευτικές πληροφορίες προϊόντος, ημερομηνία εκτύπωσης 26 Σεπτεμβρίου 2025, δεν υπόκεινται σε συστηματικές αλλαγές.

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co.KG
Am Stadtholz 37
33609 Bielefeld
www.stockmeier.com