# ACTIV AMINOVIT

υγρό

## Διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή με βιταμίνες και απαραίτητα αμινοξέα σε υγρή μορφή

## ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΛΙΤΡΟ

**Πρόσθετες ύλες / Λίτρο:**

| **Αμινοξέα:** | | **Βιταμίνες:** | |
|---|---|---|---|
| Γλυκίνη | 5 000 mg | Βιοτίνη | 15 mg |
| Νικοτιναμίδιο | 10 000 mg | Βιταμίνη A | 4 230 000 I.U. |
| L-λυσίνη | 20 000 mg | Βιταμίνη $D_3$ | 1 000 000 I.U. |
| DL-Μεθειονίνη | 10 000 mg | Βιταμίνη E | 5 000 mg |
| L-θρεονίνη | 10 000 mg | Βιταμίνη $B_1$ | 1 250 mg |
| L-τρυπτοφάνη | 2 000 mg | Βιταμίνη $B_2$ | 2 000 mg |
| | | Βιταμίνη $B_6$ | 1 500 mg |
| | | Βιταμίνη $B_{12}$ | 5 000 mcg |

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το ACTIV AMINOVIT είναι διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή που βοηθάει σε περιπτώσεις διατροφικών ανισορροπιών και υποστηρίζει την προετοιμασία του οίστρου και της αναπαραγωγής.

## ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προστατεύει από ανεπάρκεια βιταμινών και αμινοξέων
- Σταθεροποιεί τις αποδόσεις των παραγωγικών ζώων σε υψηλό επίπεδο
- Χορηγείται σε περιπτώσεις που τα ζώα έχουν ανάγκη από την προσθήκη στο πόσιμο νερό ισόρροπου σκευάσματος βιταμινών και απαραίτητων αμινοξέων όπως π.χ.:
  ✓ σε περιόδους αύξησης/αποκατάστασης σωματικής διάπλασης
  ✓ σε περιόδους καταπόνησης (stress) ή εκδήλωσης νοσημάτων
  ✓ μετά από εμβολιασμό ή θεραπεία
- κατά την διάρκεια αλλαγών των συνθηκών διατροφής και σταβλισμού
- Προασπίζει την ακεραιότητα του επιθηλίου του πεπτικού, του αναπνευστικού και του αναπαραγωγικού συστήματος
- Βοηθάει στην ρύθμιση του μεταβολισμού του ασβεστίου και του φωσφόρου
- Ενισχύει τον μεταβολισμό των υδατανθράκων και της πρωτεϊνοσύνθεσης
- Προάγει την κυτταρική αναπνοή

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

**Πτηνά**: 1,1 - 2 λίτρα ACTIV AMINOVIT ανά 1000 λίτρα πόσιμου νερού.

**Αίγες γαλακτοπαραγωγής και Χοίροι αναπαραγωγής**: 6 ml/ζώο/ημέρα.

**Πρόβατα γαλακτοπαραγωγής**: 12 ml/ζώο/ημέρα. **Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής**: 47 ml/ζώο/ημέρα.

**Απογαλακτισμένα βοοειδή, πρόβατα και αίγες**: 5,1 ml/ζώο/ημέρα. **Μοσχίδες**: 38 ml/ζώο/ημέρα.

**Αγελάδες σε θηλασμό και ξηρά περίοδο**: 31 ml/ζώο/ημέρα. **Νεαρά βοοειδή, ταυρίδια**: 14 ml/ζώο/ημέρα.

**Συνήθης συνιστώμενη διάρκεια εφαρμογής**: 2 έως 15 ημέρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δοσολογία ανά είδος ζώου, ανά διατροφικό σκοπό και την διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος διαβάστε την ετικέτα.

Πριν από τη χρήση ή πριν από την επιμήκυνση της περιόδου χρήσης, πρέπει να λαμβάνονται συμβουλές από ειδικό στην διατροφή ή κτηνίατρο. Ανακινείστε καλά πριν την χρήση.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία του 1 ή των 5 λίτρων.

## ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Προστατέψτε το προϊόν από την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και τον αέρα. Κλείστε την συσκευασία μετά την χρήση.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

24 μήνες μετά την ημερομηνία παρασκευής, στον αρχικό περιέκτη χωρίς να ανοιχτεί.

VITAL concept

ANIMAL HEALTH PRODUCTS
Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr web: www.ahprod.gr
Αρ. Έγκρισης Υ.Α.Α. & Τ.: αEL020 0041
Κωδικός Εγγραφής: 22220 020 000237

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 200012600188819
TÜV AUSTRIA EN ISO 14001:2015 No.: 200512600188820

VITAL concept

ZI de Très le Bois - CS 60362
22603 LOUDEAC CEDEX

N° d'agrément distributeur :
a FR 22 136 044
vital-concept.com

5 207291 036250

Είδος ζώου:
Ζώα αναπαραγωγής

# ACTIV AMINOVIT

## Διαιτητική Συμπληρωματική Ζωοτροφή

Υποστήριξη της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής Υποστήριξη των διατροφικών ανισορροπιών στην διατροφική μετάβαση

**Πρόσθετες ύλες ανά λίτρο:**

3a - βιταμίνες

| | |
|---|---|
| 3a672b Βιταμίνη A: | 4 230 000 UI |
| 3a671 Βιταμίνη D3 : | 1 000 000 UI |
| 3a315 Νικοτιναμίδιο : | 10 000 mg |
| 3a700 Βιταμίνη E : | 5 000 mg |
| 3a826 Βιταμίνη B2: | 2 000 mg |
| 3a831 Βιταμίνη B6: | 1 500 mg |
| 3a820 Βιταμίνη B1: | 1 250 mg |
| 3a880 Βιοτίνη: | 15 mg |
| 3a835 Βιταμίνη B12: | 5 mg |
| 2b – αρωματικές ουσίες : | |
| 2b17034 Γλυκίνη: | 5 000 mg |
| 3c– αμινοξέα : | |
| 3c322 L-λυσίνη μονοϋδροχλωρική | 20 000 mg |
| 3c301 DL-μεθειονίνη: | 10 000 mg |
| 3c410 L-θρεονίνη: | 10 000 mg |
| 3c440 L-τρυπτοφάνη: | 2 000 mg |

**Πρώτες ύλες:**
13.11.1 Προπυλενογλυκόλη,
11.4.2 Διπανθρακικό νάτριο,
13.5.5 Σορβιτόλη

**Αναλυτικά συστατικά :**

| | |
|---|---|
| Υγρασία : | 89,296% |
| Ολικές Αζωτούχες Ουσίες: | 4,320% |
| Ολικές Ινώδεις Ουσίες: | 0,141% |
| Ολικές Λιπαρές Ουσίες : | 0,015% |
| Ολική Τέφρα: | 0,462% |
| Λυσίνη: | 1,913% |
| Μεθειονίνη: | 0,971% |
| Νάτριο: | 0,281% |

**Οδηγίες χρήσης:**
Ανακινείστε πριν τη χρήση. Να χρησιμοποιείται απευθείας στο σιτηρέσιο ή αραιωμένο σε νερό. Η δόση θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση, σύμφωνα με την παρακάτω μέγιστη δοσολογία ανά είδος ζώου.

**Συστάσεις:**
Το προϊόν πρέπει να παραμένει αποθηκευμένο στην αρχική συσκευασία, ερμητικά κλειστό, προστατευμένο από το φως και μεταξύ 5 και 25 °C. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ειδικού στην διατροφή ή κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης.

**Συσκευασία : 1 ΛΙΤΡΟ**

**Ημερομηνία Παραγωγής:**
XX/XXXX
**Ημερομηνία Λήξης:**
XX/XXXX
**Αριθμός Παρτίδας:**
XXXXXXX

Agrement :
aFR 22-171-015

VITAL concept

ZI de Très le Bois - CS 60362
22603 LOUDEAC CEDEX

N° d'agrément distributeur :
a FR 22 136 044
vital-concept.com

5 207291 035406

Είδος ζώου:
Ζώα αναπαραγωγής

# ACTIV AMINOVIT

## Διαιτητική Συμπληρωματική Ζωοτροφή

| Διατροφικός σκοπός | Υποστήριξη της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής | Υποστήριξη των διατροφικών ανισορροπιών στην διατροφική μετάβαση |
|---|---|---|
| Διάρκεια χρήσης | Διάρκεια ανάλογα με το είδος ζώου (βλέπε παρακάτω) | 2 έως 15 ημέρες |
| Αγελάδες Γαλακτοπαραγωγής | 47 ml, 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης. | 47 ml |
| Αγελάδες σε θηλασμό και ξηρά περίοδο | 31 ml, 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης. | 31 ml |
| Μοσχίδες | 38 ml, 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης. | 38 ml |
| Νεαρά βοοειδή, ταυρίδια | 14 ml<br>Θηλυκά: από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης.<br>Αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας. | 14 ml |
| Απογαλακτισμένα βοοειδή, πρόβατα και αίγες | 5,1ml<br>Θηλυκά: από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης. Αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας. | 5,1ml |
| Αίγες γαλακτοπαραγωγής | 6 ml, από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης. | 6 ml |
| Πρόβατα γαλακτοπαραγωγής | 12 ml, από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης. | 12 ml |
| Χοίροι αναπαραγωγής | 6 ml<br>Χοιρομητέρες: 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά τον τοκετό και 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά το ξεγάλακτωμα.<br>Αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας. | 6 ml |
| Κοτόπουλα | Λιγότερο από 14 ημέρες: 2 L σε 1000 L νερό.<br>Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου.<br>Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας. | Λιγότερο από 14 ημέρες: 2 L σε 1000 L νερό |
| | Πάνω από 14 ημέρες: 1,1 L σε 1000 L νερό.<br>Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου.<br>Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας. | Πάνω από 14 ημέρες: 1,1L σε 1000 L νερό |
| Ωοτόκες όρνιθες | 1,1L σε 1000 L νερό, κατά τη διάρκεια του οίστρου. | 1,1L σε 1000 L νερό |
| Γαλοπούλες | Λιγότερο από 28 ημέρες: 1,9 L σε 1000 L νερό.<br>Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου.<br>Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας. | Λιγότερο από 28 ημέρες: 1,9 L σε 1000 L νερό |
| | Πάνω από 28 ημέρες: 1,1L σε 1000 L νερό.<br>Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου.<br>Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας. | Πάνω από 28 ημέρες: 1,1L σε 1000 L νερό |
| Φραγκέδικοτες | Λιγότερο από 14 ημέρες: 1,6 L σε 1000 L νερό.<br>Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου.<br>Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας. | Λιγότερο από 14 ημέρες: 1,6 L σε 1000 L νερό |
| | Πάνω από 14 ημέρες: 1,1L σε 1000 L νερό.<br>Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του οίστρου.<br>Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας. | Πάνω από 14 ημέρες: 1,1L σε 1000 L νερό |