ACTIVIT υγρό

Συμπυκνωμένο πολυβιταμινούχο σκεύασμα σε υγρή μορφή για πτηνά, χοίρους και μηρυκαστικά

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΛΙΤΡΟ

Βιταμίνη A	4 230 000	IU	Βιταμίνη B_6	1 200	mg
Βιταμίνη D_3	1 000 000	IU	Βιταμίνη B_{12}	12 000	mcg
Βιταμίνη E	5 000	mg	Νικοτιναμίδιο	12 000	mg
Βιταμίνη K_3	800	mg	Παντοθενικό ασβέστιο	3 000	mg
Βιταμίνη B_1	1 200	mg	Βιταμίνη C	5 000	mg
Βιταμίνη B_2	2 500	mg			

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το ACTIVIT είναι μια διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή που βοηθάει σε περιπτώσεις διατροφικών ανισορροπιών και υποστηρίζει την προετοιμασία του οίστρου και της αναπαραγωγής.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προστατεύει από ανεπάρκεια βιταμινών
- Σταθεροποιεί τις αποδόσεις των παραγωγικών ζώων σε υψηλό επίπεδο
- Χορηγείται σε περιπτώσεις που τα ζώα έχουν ανάγκη από την προσθήκη στο πόσιμο νερό ισόρροπου πολυβιταμινούχου σκευάσματος όπως π.χ.:
  - ✓ σε περιόδους καταπόνησης (stress) ή εκδήλωσης νοσημάτων
  - ✓ μετά από εμβολιασμό ή θεραπεία
  - ✓ κατά την διάρκεια αλλαγών των συνθηκών διατροφής και σταβλισμού
- Προασπίζει την ακεραιότητα του επιθηλίου του πεπτικού, του αναπνευστικού και του αναπαραγωγικού συστήματος
- Βοηθάει στην ρύθμιση του μεταβολισμού του ασβεστίου και του φωσφόρου
- Ενισχύει τον μεταβολισμό των υδατανθράκων
- Προάγει την κυτταρική αναπνοή

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Πτηνά: 1,1 – 2 λίτρα Activit υγρό ανά 1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Αίγες γαλακτοπαραγωγής: 600 ml/1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Χοίροι αναπαραγωγής: 300 ml/1000 λίτρα πόσιμου νερού

Πρόβατα γαλακτοπαραγωγής: 1,2 λίτρα/1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Απογαλακτισμένα βοοειδή, πρόβατα και αίγες: 425 ml/1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 451 ml/1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Μοσχίδες: 844 ml/1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Αγελάδες σε θηλασμό και ξηρά περίοδο: 435 ml/1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Νεαρά βοοειδή, ταυρίδια: 457 ml/1000 λίτρα πόσιμου νερού.

Συνήθης διάρκεια εφαρμογής: 2 έως 15 ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δοσολογία ανά είδος ζώου, ανά διατροφικό σκοπό και την διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος διαβάστε την ετικέτα.

Πριν από τη χρήση ή πριν από την επιμήκυνση της περιόδου χρήσης, πρέπει να λαμβάνονται συμβουλές από ειδικό στην διατροφή ή κτηνίατρο. Ανακινείστε καλά πριν την χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία του 1 ή 5 λίτρων.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Προστατέψτε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον αέρα. Κλείστε την συσκευασία μετά την χρήση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

24 μήνες μετά την ημερομηνία παρασκευής, στον αρχικό περιέκτη χωρίς να ανοιχτεί.

VITAL concept

ANIMAL HEALTH PRODUCTS
Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr web: www.ahprod.gr
Αρ. Έγκρισης Υ.Α.Α. & Τ.: αEL020 0041
Κωδικός Εγγραφής: 22220 020 000237

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 20001260018819
TÜV AUSTRIA EN ISO 14001:2015 No.: 20051260018820

VITAL concept

ZI de Très le Bois - CS 60362
22603 LOUDEAC CEDEX

N° d'agrément distributeur :
a FR 22 136 044
vital-concept.com

5 207291 035406

Είδος ζώου:
Ζώα αναπαραγωγής

ACTIVIT

Διαιτητική Συμπληρωματική Ζωοτροφή

Υποστήριξη της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής
Υποστήριξη των διατροφικών ανισορροπιών στην διατροφική μετάβαση

Πρώτες ύλες: 13.11.1 Προπυλενογλυκόλη, 13.5.5 Σορβιτόλη

Πρόσθετες ύλες ανά λίτρο:

3a - βιταμίνες z

3a672b Βιταμίνη A:	4 230 000 UI
3a671 Βιταμίνη D3 :	1 000 000 UI
3a315 Νικοτιναμίδιο :	12 000 mg
3a700 Βιταμίνη E :	5 000 mg
3a300 Βιταμίνη C :	5 000 mg
3a842 D-πανθενόλη :	3 000 mg
3a826 Βιταμίνη B2:	2 500 mg
3a820 Βιταμίνη B1:	1 200 mg
3a831 Βιταμίνη B6:	1 200 mg
3a710 Βιταμίνη K3:	800 mg
3a835 Βιταμίνη B12:	12 mg

Αναλυτικά συστατικά :

Υγρασία :	89,395%
Ολικές Αζωτούχες Ουσίες:	0,134%
Ολικές Ινώδεις Ουσίες:	<0,001%
Ολικές Λιπαρές Ουσίες :	<0,003%
Ολική Τέφρα:	0,072%
Λυσίνη:	<0,001%
Μεθειονίνη:	<0,001%
Νάτριο:	0,025%

δηγίες χρήσης:
Ανακινείστε πριν τη χρήση. Να χρησιμοποιείται απευθείας στο σιτηρέσιο ή αραιωμένο σε νερό.
Η δόση θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση, σύμφωνα με την παρακάτω μέγιστη δοσολογία ανά είδος ζώου.

Συστάσεις:
Το προϊόν πρέπει να παραμένει αποθηκευμένο στην αρχική συσκευασία, ερμητικά κλειστό, προστατευμένο από το φως και μεταξύ 5 και 25 °C. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ειδικού στην διατροφή ή κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης.

Συσκευασία : 1 ΛΙΤΡΟ

Ημερομηνία Παραγωγής:
01/2023
Ημερομηνία Λήξης:
01/2025
Αριθμός Παρτίδας:
2300901

Agrement :
αFR 22-171-015

VITAL concept

ZI de Très le Bois - CS 60362
22603 LOUDEAC CEDEX

N° d'agrément distributeur :
a FR 22 136 044
vital-concept.com

5 207291 035406

Είδος ζώου:
Ζώα αναπαραγωγής

ACTIVIT

Διαιτητική Συμπληρωματική Ζωοτροφή

Διατροφικός σκοπός	Υποστήριξη της προετοιμασίας του οίστρου και της αναπαραγωγής	Υποστήριξη των διατροφικών ανισορροπιών στην διατροφική μετάβαση
Διάρκεια χρήσης	Διάρκεια ανάλογα με το είδος ζώου (βλέπε παρακάτω)	2 έως 15 ημέρες
Αγελάδες Γαλακτοπαραγωγής	451 mL σε 1000 L νερό 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης.	451 mL σε 1000 L νερό
Αγελάδες σε θηλασμό και ξηρά περίοδο	465 mL σε 1000 L νερό 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης.	465 mL σε 1000 L νερό
Μοσχίδες	844 mL σε 1000 L νερό 2 εβδομάδες πριν από το τέλος της κύησης και μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης.	844 mL σε 1000 L νερό
Νεαρά βοοειδή, ταυρίδια	457 mL σε 1000 L νερό θηλυκά: από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης. Αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.	457 mL σε 1000 L νερό
Απογαλακτισμένα βοοειδή, πρόβατα και αίγες	425 mL σε 1000 L νερό θηλυκά: από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης. Αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.	425 mL σε 1000 L νερό
Αίγες γαλακτοπαραγωγής	600 mL σε 1000 L νερό Από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης	600 mL σε 1000 L νερό
Πρόβατα γαλακτοπαραγωγής	1,2 L σε 1000 L νερό Από το τελευταίο διάστημα της κύησης μέχρι την επιβεβαίωση της επόμενης κύησης.	1,2 L σε 1000 L νερό
Χοίροι αναπαραγωγής	300 mL σε 1000 L νερό Χοιρομητέρες: 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά τον τοκετό και 7 ημέρες πριν και έως 3 ημέρες μετά το ζευγάρωμα. Αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.	300 mL σε 1000 L νερό
Κοτόπουλα	Λιγότερο από 14 ημέρες: 2 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του ώσπρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.	Λιγότερο από 14 ημέρες: 2 L σε 1000 L νερό
	Πάνω από από 14 ημέρες: 1,1L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του ώσπρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.	Πάνω από από 14 ημέρες: 1,1L σε 1000 L νερό
Ωοτόκες όρνιθες	1,1L σε 1000 L νερό, κατά τη διάρκεια του ώσπρου.	1,1L σε 1000 L νερό
Γαλοπούλες	Λιγότερο από 28 ημέρες: 1,9 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του ώσπρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.	Λιγότερο από 28 ημέρες: 1,9 L σε 1000 L νερό
	Πάνω από από 28 ημέρες: 1,1L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του ώσπρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.	Πάνω από από 28 ημέρες: 1,1L σε 1000 L νερό
Φραγκόκοτες	Λιγότερο από 14 ημέρες: 1,6 L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του ώσπρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.	Λιγότερο από 14 ημέρες: 1,6 L σε 1000 L νερό
	Πάνω από από 14 ημέρες: 1,1L σε 1000 L νερό Για τα θηλυκά: κατά τη διάρκεια του ώσπρου. Για τα αρσενικά: κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγικής δραστηριότητας.	Πάνω από από 14 ημέρες: 1,1L σε 1000 L νερό