Mycobond σκόνη

Συμπληρωματική ανόργανη ζωοτροφή για πουλερικά, μηρυκαστικά και χοίρους

Αρ. πρωτ.: Υ.Α.Α. & Τ. Mycobond σκόνη: 327954 από 16/09/2009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **Mycobond** μειώνει τη μόλυνση της ζωοτροφής από μυκοτοξίνες. Οι μυκοτοξίνες είναι προϊόντα του μεταβολισμού των μυκήτων που δεν εξουδετερώνονται με τη χρήση των αντιμυκητιακών ουσιών.

Από τη στιγμή που αρχίζει ο πολλαπλασιασμός των μυκήτων (ο οποίος τις περισσότερες φορές δεν είναι αντιληπτός) είναι απόλυτα σίγουρο ότι παράλληλα αρχίζει και η παραγωγή των μυκοτοξινών τους.

Οι περισσότερο γνωστές και επικίνδυνες μυκοτοξίνες για την υγεία των ζώων και του ανθρώπου, αφού περνούν στα παραγόμενα ζωοκομικά τρόφιμα, είναι οι εξής:

- Αφλατοξίνες
- Τ2 τοξίνη
- Τοξίνη DON (Εμετοτοξίνη)
- Ζεαραλενόνη
- Ωχρατοξίνες
- Φουμονισίνες

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το **Mycobond** μειώνει τη μόλυνση της ζωοτροφής από μυκοτοξίνες. Οι ζωοτροφές είναι γνωστό ότι αποτελούν ιδανικό υπόστρωμα για τον πολλαπλασιασμό των μυκήτων καθώς και για την παραγωγή των μυκοτοξινών τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μείωση της εμφάνισης παθογόνων συμπτωμάτων από τη δράση των μυκοτοξινών στα παραγωγικά ζώα.
- Αποκατάσταση του ρυθμού αύξησης και ανάπτυξης των ζώων.
- Πιο αποτελεσματική αξιοποίηση της ζωοτροφής.
- Μείωση της θνησιμότητας.
- Μείωση των πεπτικών διαταραχών.
- Μείωση των αναπαραγωγικών προβλημάτων.
- Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.
- Παραγωγή ασφαλών ζωοκομικών προϊόντων.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Σύνθεση: χλωριούχο νάτριο (11.4.1), δεξτρόζη (13.2.2). Πρόσθετες ύλες: συνδετικό, αντιπηκτικό και θρομβωτικό μέσο: σεπιόλιθος (1g562), γη διατόμων που έχει υποστεί καθαρισμό (E551c). Ουσία για τη μείωση της μόλυνσης της ζωοτροφής από μυκοτοξίνες: μπεντονίτης (1m558).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το **Mycobond** δεσμεύει τις μυκοτοξίνες που τυχόν υπάρχουν στις ζωοτροφές με αποτέλεσμα οι μυκοτοξίνες να διέρχονται τον πεπτικό σωλήνα και να αποβάλλονται με τα κόπρανα.

- Το **Mycobond** δεν επιτρέπει την απορρόφηση των μυκοτοξινών από τον οργανισμό και επομένως προστατεύει τα ζώα από την επιβλαβή και συχνά θανατηφόρα δράση τους.
- Το **Mycobond** προστατεύει έμμεσα και τον καταναλωτή ζωικών τροφίμων, αφού με την χρήση του οι μυκοτοξίνες που τυχόν υπάρχουν στις ζωοτροφές των παραγωγικών ζώων δεν περνούν στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης όπως π.χ. γάλα, κρέας, αυγά.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

1 - 5 κιλά ανά τόνο τελικού σιτηρεσίου. Η δόση εξαρτάται από την ποσοτική και ποιοτική επιβάρυνση των ζωοτροφών σε μυκοτοξίνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκοι των 25 κιλών σε στερεή μορφή.

Anpario

ANIMAL HEALTH PRODUCTS
Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr web: www.ahprod.gr
Αρ. Έγκρισης Υ.Α.Α. & Τ.: αEL020 0041
Κωδικός Εγγραφής: 22220 020 000237

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 20001260018819
TÜV AUSTRIA EN ISO 14001:2015 No.: 20051260018820

MYCOBOND

Συμπληρωματική ανόργανη ζωοτροφή για πουλερικά, μηρυκαστικά και χοίρους.
Αποκλειστικά για την παρασκευή ζωοτροφών

Σύνθεση:
χλωριούχο νάτριο (11.4.1), Δεξτρόζη (13.2.2).
Πρόσθετες ύλες (ανά κιλό)
Συνδετικό, αντιπηκτικό και θρομβωτικό μέσο:
Σεπιόλιθος (1g562) 853 000 mg
Γη διατόμων που έχει υποστεί καθαρισμό (E551c)
Ουσία για την μείωση της μόλυνσης της ζωοτροφής από μυκοτοξίνες:
Μπεντονίτης (1m558) 50 000 mg
Αναλυτικά συστατικά:
Ολική τέφρα: 83,2% · Ασβέστιο: 1,63% · Νάτριο: 0,61% · Φώσφορος: 0,01%
Μαγνήσιο: 16,48% · Λυσίνη: 0,00% · Μεθειονίνη: 0,00%

Οδηγίες Χρήσης:
Η ανάμειξη να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό. 1 - 5 κιλά ανά τόνο τελικού σιτηρεσίου.

Για ειδικές περιπτώσεις, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Anpario στην Ελλάδα, Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Δεν υπάρχει υπολειμματική περίοδος

Διάρκεια Ζωής:
24 μήνες μετά την ημερομηνία παρασκευής

Συνθήκες Αποθήκευσης: Αποθηκεύστε το σε ξηρό περιβάλλον, σε καλά αεριζόμενο χώρο στην αρχική συσκευασία

Σημείωση:
Διασφαλίστε επαρκή αερισμό στον χώρο εργασίας.
Η καλή ανάμειξη είναι απαραίτητη.
Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης.
Φορέστε μάσκα για την αποφυγή εισπνοής σκόνης. Δεν έχει υπολειμματική διάρκεια.
Για τα πουλερικά: Η ταυτόχρονη χρήση με ροβενιδίνη πρέπει να αποφεύγεται.
Η ταυτόχρονη χρήση με κοκκιδιοστατικά άλλα από την ροβενιδίνη αντενδείκνυται όταν το επίπεδο του μπεντονίτη υπερβαίνει τα 5 000 mg/kg πλήρους ζωοτροφής.
Η συνολική ποσότητα μπεντονίτη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 20 000 mg/kg πλήρους ζωοτροφής.
Η ταυτόχρονη χρήση από το στόμα με μακρολίδια πρέπει να αποφεύγεται.
Να χρησιμοποιούνται μάσκα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφάλειας κατά τον χειρισμό.

Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α. & Τ.: 327954 από 16/09/2009