Optimax® σκόνη

Οξινοποιητής υψηλής συγκέντρωσης με αιθέρια έλαια

Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α. & Τ.: 197895 από 14/11/2011

ΧΡΗΣΗ

Αντιβακτηριακό πρόμιγμα, σε μορφή οξινοποιητή υψηλής συγκέντρωσης, ενσωματωμένο στον καινοτόμο φορέα μικροσφαιριδίων, για χρήση ως απολυμαντικό παράγοντα σε ζωοτροφές και σε προμίγματα που θα βελτιώσει την υγιεινή τους. Ενισχύει τις αποδόσεις πτηνών και χοίρων μέσω του ελέγχου των παθογόνων εντεροβακτηρίων και της προώθησης ενός ευνοϊκού συνόλου ζώντων μικροοργανισμών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλά ποσοστά οργανικών οξέων και αλάτων τους.
- Αιθέρια έλαια τα οποία παρέχουν διπλή δράση.
- Φορέας σε μορφή μικροσφαιριδίων, ο οποίος διασφαλίζει την ομοιόμορφη διασπορά του προϊόντος.
- Χαμηλή δοσολογία στο σιτηρέσιο.
- Ελεύθερης ροής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άμεση δράση κατά των Gram αρνητικών παθογόνων βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένης και της Salmonella spp.).
- Τα καρβοξυλικά οξέα του Optimax δρουν συνεργικά μεταξύ τους.
- Τα αιθέρια έλαια του Optimax βοηθούν στην διείσδυση και διάσπαση του κυτταρικού τοιχώματος των βακτηρίων.
- Βελτίωση των αποδόσεων των ζώων μέσω της καλύτερης πέψης.
- Ευκολία στην χρήση σε σύγκριση με τα οξέα σε υγρή μορφή.
- Ιδανικό για χρήση μέσω προμιγμάτων ή απ' ευθείας στο τελικό σιτηρέσιο.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Χοίροι	1,0 – 3,0 κιλά/τόνο τελικού σιτηρεσίου
Πτηνά	0,50 - 1,0 κιλό/τόνο τελικού σιτηρεσίου
Πρώτες ύλες	1-15 κιλά/τόνο, εξαρτώμενη από τον ταυτοποιημένο κίνδυνο

Μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας στις ζωοτροφές.

Σε δύσκολες πρώτες ύλες προτείνεται να γίνει προανάμιξη.

Η ενσωμάτωση στα προμίγματα γίνεται μέσω δοσομετρικού μηχανισμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκοι των 25 κιλών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

24 μήνες μετά την ημερομηνία παρασκευής.

Anpario

ANIMAL HEALTH PRODUCTS
Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr web: www.ahprod.gr
Αρ. Έγκρισης Υ.Α.Α. & Τ.: αEL020 0041
Κωδικός Εγγραφής: 22220 020 000237

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 20001260018819
TÜV AUSTRIA EN ISO 14001:2015 No.: 20051260018820

UFI: 82VR-U316-U002-M849

OPTIMAX

ΠΡΟΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ & ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ

Σύνθεση:

Μυρμηκικό νάτριο (1k237)[1]
Μυρμηκικό οξύ (1k236)[1]
Προπιονικό οξύ (1k280)[1]
Έκδοχο: Διοξείδιο του πυριτίου (E551b)[1]
Αρωματικές ενώσεις: Κινναμωαλδεΰδη (Cas no: 104-55-2)

Δοσολογία:

Χοίροι: 1,0 - 3,0 κιλά/τόνο τελικού σιτηρεσίου

Πτηνά: 0,5 - 1,0 κιλό/τόνο τελικού σιτηρεσίου

Σημ.: Η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών οξέων ή αλάτων τους αντενδείκνυται όταν ένα ή περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούνται στην μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ή την προσεγγίζουν.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

Δηλώσεις Προφυλάξεων:

Πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό

Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας ματιών & προσώπου

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

Εάν φοράτε φακούς επαφής, απομακρύνετε τους εφ' όσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε οδηγίες στην ετικέτα) Φυλάσσεται κλειδωμένο

Διάθεση του περιέκτη σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων

[1] *ο αλφαριθμητικός χαρακτήρας: σημαίνει ότι αυτή η δραστική ουσία έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο των εγκεκριμένων πρόσθετων υλών για ενσωμάτωση στις ζωοτροφές των παραγωγικών ζώων στο χώρο της Ε.Ε. σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 και αριθ. 769/2009*

Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α. & Τ.: 197895 από 14/11/2011